

SINGE-LION À TÊTE DORÉE



NOM NÉERLANDAIS
Goudkopleeuwaapje

NOM FRANÇAIS
Singe-lion à tête dorée

NOM ANGLAIS
Golden-headed
lion tamarin

NOM SCIENTIFIQUE
Leontopithecus chrysomelas

LES SINGES-LIONS À TÊTE DORÉE ...

- vivent en groupes de 2 à 8 individus: un couple avec des jeunes d'âges différents.
- sautent de branche en branche à une vitesse incroyable. Les doigts allongés partiellement reliés l'un à l'autre leur permettent de saisir fermement les branches, même lors de larges bonds, pour ne pas retomber aux étages inférieurs de la forêt. Ils sont capables de faire des sauts de 5 m!
- dorment de préférence dans les trous de grands arbres.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe: mammifères
- Ordre: primates
- Famille: callitrichinés
- Longueur tête-tronc: 22 - 26 cm
- Poids: ♂ 540 - 700 g
♀ 480 - 590 g
- Longueur de la queue: 33 - 39 cm

AIRE DE RÉPARTITION

Le singe-lion à tête dorée vit au Brésil. Il habite une très petite région côtière au sud de l'état de Bahia. Les territoires isolés, très éloignés les uns des autres, du singe-lion à tête dorée ne sont peut-être que les derniers vestiges d'une grande aire de répartition qui s'étendait jadis de Bahia à São Paulo et jusqu'au Rio Parana.

BIOTOPE

Forêts primaires et secondaires touffues. Ils habitent les couches supérieures de la forêt.



AIRE DE RÉPARTITION
DES SINGES-LIONS À TÊTE DORÉE



Statut IUCN
**EN
DANGER**



RÉGIME ALIMENTAIRE

Les singes-lions à tête dorée se nourrissent de fruits, de fleurs, de nectar, de résine et de petits animaux comme des grenouilles, petits serpents et lézards.

Ils cherchent et trouvent la majorité de leur nourriture dans les bromélias qui poussent dans les arbres à une hauteur de 10 à 20 mètres.

REPRODUCTION

Après une gestation de 125 à 132 jours, ils donnent naissance en général à 2 petits, parfois 1 seul. A la naissance, un tamarin pèse environ 60 grammes. Juste après leur naissance, les petits s'agrippent à leur mère. Après les premières semaines, les autres membres du groupe reprennent le rôle de la mère. Celle-ci s'occupe alors uniquement de la nourriture.

Les bébés sont la réplique légèrement plus claire de leurs parents.

Les singes-lions à tête dorée atteignent leur maturité sexuelle à partir d'1 an et demi.

MENACÉ

L'habitat des singes-lions à tête dorée est fortement réduit et fragmenté par l'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière.

EEP

La KMDA gère le livre généalogique des singes-lions à tête dorée.

L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces menacées appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne le programme d'élevage.