

INDISCHE NEUSHOORN



NEDERLANDSE NAAM

Indische neushoorn

FRANSE NAAM

Rhinocéros unicolore des Indes

ENGELSE NAAM

Greater Indian rhinoceros
(greater one-horned rhinoceros)

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Rhinoceros unicornis

INDISCHE NEUSHOORNS ...

- worden ook wel pantserneushoorns genoemd. De huid is op sommige plaatsen zodanig geplooid, dat het dier in een wapenuitrusting lijkt gestoken.
- dragen een hoorn van 25 cm, of 24 cm bij het vrouwtje. De hoorn is korter dan die van de Afrikaanse neushoornsoorten.
- gebruiken hun hoorn niet echt om te vechten. Hiervoor hebben ze hun lange hoektanden, tot 6,5 cm groot bij het mannetje. In combinatie met hun sterke nek- en schouderspieren kunnen ze hiermee stevig vechten.

KENMERKEN

- Klasse: zoogdieren
- Orde: onevenhoevigen
- Familie: neushoorns
- Lengte kop-romp: 335 - 346 cm
De Indische neushoorn is het vijfde grootste landzoogdier.
- Schofthoogte: 175 - 200 cm
- Gewicht: Het mannetje weegt zo'n 2000 kg. Vrouwtjes zijn meestal minder zwaar en kleiner.
- Lengte staart: ± 66 cm

VERSPREIDINGSGEBIED

De Indische neushoorn komt nog voor in Nepal en India.

BIOTOOP

Je vindt de Indische neushoorn in graslanden, in de nabijheid van rivieren.





IUCN-status
KWETSBAAR



VOEDING

Hun voeding bestaat uit grassen, waterplanten, kruiden, vruchten, twijgen en bladeren die ze van de tak strippen met hun bovenlip.

VOORTPLANTING

De **paring** bij de neushoorn is een **heus schouwspel**. Het mannetje moet het vrouwtje achtervolgen en doet vaak meerdere pogingen tot paren. De **bronzige vrouwtjes** maken **fluitgeluiden**.

De paring zelf duurt een half uur tot een uur. Het vrouwtje zoekt een afgelegen plek in dikke begroeiing om haar jong op de wereld te zetten. Net voor en na de bevalling is ze agressief naar andere neushoorns toe.

Na een **dracht** van **16 maanden** wordt er een jong geboren. Het jong kan snel staan, maar in het begin staat het nog onstabiel op de poten. De moeder laat haar jong alleen om voedsel te zoeken maar ze blijft wel in de buurt.

Vrouwtjes kunnen voor de **eerste keer drachtig** worden vanaf de leeftijd van **7 jaar**. Tussen twee geboortes zitten gemiddeld 46 maanden.

BEDREIGD

Zowel in India als in Nepal waren er op een gegeven moment nog maar enkele tientallen neushoorns over, nu zijn er weer zo'n 2500 dieren, de meeste in Kaziranga in India en in Chitwan in Nepal.

De belangrijkste bedreigingen voor de Indische neushoorn zijn de jacht (als jachttrofee en omwille van hun hoorn) en de veranderingen in hun habitat (concurrentie met het vee van de lokale bevolking én exoten die de graslanden overwoekeren).

EEP

Het EEP wordt gecoördineerd door Zoo Basel (Zwitserland). Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.