

REUZENMIERENETER



NEDERLANDSE NAAM

Reuzenmierener

FRANSE NAAM

Tamanoir

ENGELSE NAAM

Giant anteater

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Myrmecophaga tridactyla

REUZENMIERENETERS ...

- negeren elkaar compleet of lopen van elkaar weg als ze elkaar in het wild tegenkomen.
- lopen op hun knokkels en polsen om hun klauwen te beschermen.
- klimmen zodra ze zijn geboren op de rug van de moeder, en doen dat tot ze 6 à 9 maanden oud zijn of bijna half zo groot als de moeder zijn.

KENMERKEN

- Klasse: zoogdieren
- Orde: luiaards en miereneters
- Familie: miereneters
- Hoogte: 1 - 1,20 m (zonder staart)
- Gewicht: 18 - 39 kg
- Max. leeftijd: 25 jaar (in dierentuinen)
- Lengte staart: 65 - 90 cm

VERSPREIDINGSGEBIED

Centraal- en Zuid-Amerika, van Belize tot Guatemala tot Noord-Argentinië

BIOTOOP

Moeras, woud en grasland



VERSPREIDINGSGEBIED
REUZENMIERENETERS



IUCN-status
KWETSBAAR



VOEDING

Op het menu staan mieren, termieten, maden. Door gebruik te maken van hun lange scherpe klauwen van de voorpoten breken ze insectenheuvels en boomstronken open. Ze gebruiken hun tong om de eieren, larven en volwassen insecten op te likken.

VOORTPLANTING

Reuzenmiereneters zijn geslachtsrijp tussen 2,5 en 4 jaar. Na een **draagtijd** van **160 dagen** wordt er **één jong** geboren dat ongeveer 1,3 kg weegt. Het jong kruipt onmiddellijk na de geboorte **op de rug van de moeder**.

De **zoogtijd** bedraagt **6 maanden**, het jong is zelfstandig na 2 jaar of vroeger wanneer de moeder terug drachtig blijkt.

BEDREIGD

De grootste bedreiging voor de miereneter is het verlies van habitat. Daarnaast wordt er ook op hen gejaagd.

EEP

Het EEP wordt beheerd door Zoo Dortmund.

Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.