

# SOMALISCHE WILDE EZEL



## NEDERLANDSE NAAM

Somalische wilde ezel

## FRANSE NAAM

Âne sauvage somalien

## ENGELSE NAAM

Somali wild ass

## WETENSCHAPPELIJKE NAAM

*Equus africanus somaliensis*

## SOMALISCHE WILDE EZELS ...

- hebben horizontale strepen op hun benen, dit is een uniek patroon per dier.
- hebben een uitstekend zicht en gehoor. Als ze de aanwezigheid van een roofdier voelen, rennen ze liever weg dan te vechten. Ze hebben echter een krachtige kick om zichzelf te beschermen wanneer dat nodig is
- zijn in het wild zijn nog maar met 70-600, waarvan 23-200 volwassenen.
- kunnen 3 dagen zonder water.

## KENMERKEN

- |                   |  |
|-------------------|--|
| • Klasse:         | Zoogdieren   |
| • Orde:           | Onevenhoevigen                                       |
| • Familie:        | Paardachtigen  |
| • Kop-romplengte: | 195-230 cm   |
| • Schofthoogte:   | 115-140 cm   |
| • Gewicht:        | 270-280 kg   |
| • Staartlengte:   | 40-45 cm   |
| • Max. leeftijd:  | Tot 20 jaar in het wild<br>(40 jaar in dierentuinen) |

## VERSPREIDINGSGBIED

Oost-Afrika, vooral in Eritrea en Ethiopië

## BIOTOOP

Struikgewassen, grasland, woestijn



VERSPREIDINGSGBIED SOMALISCHE WILDE EZEL



## VOEDING

Alle wilde ezels zijn herbivoren en brengen hun tijd door met grazen op grassen, maar ze eten ook struikgewas, schors en taaie woestijnplanten.

## VOORTPLANTING

Hengsten vechten met elkaar in, om te kijken wie met het vrouwtje mag paren. De draagtijd van de merrie is 11 maanden. De veulens kunnen hun moeder binnen een paar uur na de geboorte volgen. Tegen de tijd dat ze een jaar oud zijn, zijn ze half volgroeid, gespeend en hebben ze hun moeder niet meer nodig. Rond twee jaar is een ezel geslachtsrijp.

## BEDREIGD

De grootste bedreiging voor de Somalische wilde ezel is de jacht (voor voedsel en medicinale doeleinden). Zo wordt van lichaamsdelen soep gemaakt en wordt het gebruikt voor de behandeling van tuberculose, constipatie, reuma, rugpijn en pijn in botten. Een andere bedreiging is de beperkte toegang tot drinkwater en voer (grotendeels als gevolg van concurrentie met vee), waarbij drachtige vrouwtjes en veulens van minder dan drie maanden oud het meeste risico lopen.

## EEP

Het EEP wordt gecoördineerd door Zoologisch Gartner Basel (in Zwitserland).

(EEP=EAZA Exsitu Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.)

