

VISAYAWRATTENZWIJN



NEDERLANDSE NAAM

Visayawrattenzwijn

FRANSE NAAM

Sanglier des Visayas

ENGELSE NAAM

Visayan warty pig

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Sus cebifrons

VISAYAWRATTENZWIJNEN ...

- hebben – bij de volwassen mannen – een mooie **kuif** op de kop staan. Tijdens de paartijd groeien de haren zelfs nog wat.
- hebben, net zoals de andere wilde zwijnen, rechte staartjes, geen gekrulde.

KENMERKEN

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| • Klasse: | zoogdieren |
| • Orde: | evenhoevigen |
| • Familie: | varkens |
| • Kop-romplengte: | ± 100 cm |
| • Schofthoogte: | ♂ tot 63 cm ♀ 30 - 45 cm |
| • Gewicht: | ♂ 35 - 40 kg ♀ 20 - 35 kg |
| • Staartlengte: | ± 23 cm |
| • Max. leeftijd: | tot 18 jaar in dierentuinen |



VERSPREIDINGSGEBIED

Visayawrattenzwijnen komen voor op de Filipijnen.

BIOTOOP

Ze leven er in grasland en bos.



VERSPREIDINGSGEBIED
VISAYAWRATTENZWIJN



VOEDING

Wrattenzwijnen eten grassen, vruchten en bladeren van steeneiken, palmen, bananenplanten en regenwormen.

VOORTPLANTING

Na een dracht van 118 dagen worden **2 tot 4 biggen** geboren.

EEP

Het EEP wordt beheerd door Zoo Wrocław (Polen). Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.

IUCN-status
KRITIEK
BEDREIGD

