

ZWARTSNAVELOOOIEVAAR



NEDERLANDSE NAAM

Zwartsnavelooievaar

FRANSE NAAM

Cigogne orientale

ENGELSE NAAM

Oriental white stork

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Ciconia boyciana

ZWARTSNAVELOOOIEVAARS ...

- maken nesten in **bomen**. Hetzelfde nest wordt jarenlang na elkaar gebruikt.

KENMERKEN

- Klasse: vogels
- Orde: ooievaarachtigen
- Familie: ooievaars
- Kop-romplengte: 110 - 115 cm
- Gewicht: ♂ 4,5 - 5,5 kg ♀ 3,7 - 5 kg
- Max. leeftijd: tot meer dan 48 jaar in dierentuinen

VOEDING

Zwartsnavelooievaars hebben verschillende soorten prooiën: voornamelijk vis, maar ook insecten, amfibieën, slangen, kleine zoogdieren en kleine vogels.

VOORTPLANTING

Het vrouwtje legt 2 tot 6 eieren die 31 tot 35 dagen bebroed worden.

VERSPREIDINGSGEBIED

Zwartsnavelooievaars broeden in Zuidoost-Siberië en Noordoost-China. Ze overwinteren in Zuidoost- en Oost-China. Een paar ooievaars overwinteren in Japan, Korea en Taiwan.

BIOTOOP

Je vindt ze in moerassen met verspreide bosjes, natte graslanden, rivieroeveren, bij voorkeur in een bos.



VERSPREIDINGSGEBIED
ZWARTSNAVELOOOIEVAAR



BEDREIGD

Het kappen van de wouden en droogleggen van de drassige gebieden zijn de belangrijkste bedreigingen voor de zwartsnavelooievaars.

EEP

Het EEP wordt beheerd door Weltvogelpark Walsrode (Duitsland).

Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.



IUCN-status
BEDREIGD

