

BONOBO



NEDERLANDSE NAAM

Bonobo

FRANSE NAAM

Bonobo

ENGELSE NAAM

Bonobo

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Pan paniscus

BONOBO'S ...

- leven in een gemeenschap met mannetjes en vrouwtjes; we spreken van ongeveer 10 tot 120 individuen in één gemeenschap. Vaak splitsen ze zich op in kleinere groepjes om te foerageren.
- paren niet enkel voor voortplanting wat bij dieren erg uitzonderlijk is. Het 'uitbundige' seksleven van bonobo's is erg bekend. Ze gebruiken seks als middel tot verzoening of als begroeting, ook om hun sociale status te bevestigen, affectie te tonen, zich af te reageren, stress te reduceren en bij grote opwindning.

KENMERKEN

- | | |
|------------------|------------------------------|
| • Klasse: | zoogdieren |
| • Orde: | primaten |
| • Familie: | mensapen |
| • Grootte: | ♂ 73 - 83 cm
♀ 70 - 76 cm |
| • Gewicht: | ♂ 36 - 43 kg
♀ 26 - 36 kg |
| • Max. leeftijd: | ± 40 jaar in een dierentuin |

VERSPREIDINGSGEBIED

Bonobo's leven in het tropisch regenwoud van de Democratische Republiek Congo. Het verspreidingsgebied is begrensd door de Congo-rivier (westen + noorden), de Lualaba-rivier (oosten) en de Kasai / Sankuru-rivier (zuiden).

BIOTOOP

Ze bewonen primaire en secundaire wouden, en ook seizoensgebonden moeraswouden met een vochtig stabiel klimaat.



VERSPREIDINGSGEBIED BONOBO'S

VOEDING

Bonobo's zijn **alleseters**. Hun dieet bestaat voor zo'n **50% uit vruchten**. Dat wordt aangevuld met bladeren, bloemen, zaden, larven, termieten, kleine reptielen, kleine zoogdieren en vogels.

VOORTPLANTING

De **cyclus** van een vrouwtje begint rond de leeftijd van **9 à 12 jaar**. Ze vertoont een **roze genitale zwelling** die het meest gezwollen is tijdens ovulatie.

De vrouwtjes krijgen hun **eerste jongen** als ze **13 à 14 jaar** zijn, hun **zwangerschap** duurt **8 maanden**. De jongen worden **tot 4 jaar** door hun moeder **gezoogd**.

BEDREIGD

Schattingen van het aantal bonobo's in de natuur lopen uiteen van 30.000 tot 50.000. Maar door de moeilijke politieke situatie in het land zijn er geen echt recente gegevens. Gedurende de laatste 20 jaar zou hun aantal gehalveerd zijn. Stropers jagen illegaal op bonobo's om verschillende redenen: ze verkopen het vlees als 'bushmeat' of verkopen de dieren als gezelschapsdier. Ook in de traditionele geneeskunde zijn bonobo's gegeerd omwille van hun zogenaamd 'genezende krachten'. De bonobo's hebben verder ook onder de oorlog in hun land te lijden. Maar de grootste bedreiging is de vernieling van de tropische bossen waarin ze leven. Die moeten vaak plaats maken voor landbouw en veeteelt. Als de ontbossing aan het huidige tempo doorgaat, zullen de tropische bossen in Congo binnen 50 tot 70 jaar misschien wel helemaal verdwenen zijn.

EOP

De KMDA beheert het Europese kweekprogramma en het internationale stamboek voor bonobo's.

Het EEP of het European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Een dierentuin coördineert het kweekprogramma.

BONOBO'S ...

- hebben een matriachale samenleving. Vrouwen hebben een hogere status en domineren de mannen. Ze sluiten allianties om de mannen te overheersen, waarbij het fysieke overwicht van de samenspannende vrouwen speelt. De positie van een man in de hiërarchie wordt bepaald door

de rang van de moeder.

- leven op de grond én in bomen. Op de grond lopen ze veelal op vier handen, steunend op de knokkels. Maar 1 % van de verplaatsingen op de grond gebeurt rechtop. In dierentuinen tot 20 %, vooral als ze eten dragen.
- zijn slanker dan chimpansees, met langere benen, roze lippen, een zwarte kleur en langer hoofdhaar.
- maken elke avond een nieuw slaapnest in een boom, op 15 tot 30 meter hoogte.



IUCN-status
BEDREIGD

