

HELMCASUARIS



NEDERLANDSE NAAM

Helmcasuaris

FRANSE NAAM

Casoar à casque

ENGELSE NAAM

Double-wattled cassowary

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Casuarius casuarius

HELMCASUARISSEN ...

- hebben lange en krachtige poten. Aan de tenen zitten scherpe **klawen** waarmee ze ernstige verwondingen kunnen veroorzaken.
- hebben op hun kop een benig **uitsteeksel**. Vandaar de naam helmcasuaris.

KENMERKEN

- Klasse: vogels
- Orde: kasuarissen en emoës
- Familie: kasuarissen
- Grootte: 130 - 170 cm
- Gewicht: ♂ 29 - 34 kg
♀ ± 58 kg

VERSPREIDINGSGEBIED

Helmcasuarissen komen voor in Papoea-Nieuw-Guinea, de Molukken en het noorden van Australië.

BIOTOOP

Ze leven in het regenwoud op gematigde hoogte, maar ook in galeriewoud, moerasbos en savannebos.



VERSPREIDINGSGEBIED
HELMCASUARISSEN



VOEDING

Helmcasuarissen eten vooral gevallen vruchten, ook enkele paddenstoelen, ongewervelden, kleine gewervelden en zelfs wat aas.

VOORTPLANTING

Na de paring legt het vrouwtje 3 tot 5 eieren in een nest. Daarna gaat ze op zoek naar een ander mannetje en herhaalt het scenario zich nog een tweetal keer. De **mannetjes nemen de zorg voor de eieren op zich en broeden** 47 tot 61 dagen. Nadien zorgen ze ook voor de kuikens. De kuikens blijven een 9-tal maanden bij het mannetje en gaan dan hun eigen weg.

EEP

Het EEP wordt beheerd door Vogelpark Avifauna (Nederland).

Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.



IUCN-status
**NIET
BEDREIGD**