

MOORMAKI



NEDERLANDSE NAAM

Moormaki

FRANSE NAAM

Lémur noir of
Lémur macaco

ENGELSE NAAM

Black lemur

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Eulemur macaco

MOORMAKI'S ...

- sterven niet van het vergif van de duizendpoten die ze af en toe eten. De maki's wrijven zelfs hun vacht in met het gif als de duizendpoten hun gif als verdediging afgeven. Dit wordt beschouwd als hulpmiddel tegen de insecten.
- hebben een grijs-zwarte vacht als ze worden geboren. De vrouwtjes krijgen na een paar weken hun bruine kleur.

KENMERKEN

- Klasse: zoogdieren
- Orde: primaten
- Familie: lemuren (maki's)
- Kop-romplengte: 39 - 45 cm
- Gewicht: 1,9 - 2 kg
- Max. leeftijd: in een dierentuin ong. 27 jaar
- Lengte staart: 51 - 65 cm

VERSPREIDINGSGEBIED

De moormaki leeft in het noordwesten van Madagaskar en de nabij gelegen eilanden Nosy Be en Nosy Komba.

BIOTOOP

De moormaki's leven in het primair en secundair regenwoud. Ze komen ook voor in de bomen van boomkwekerijen en landbouwgebieden met bomen zoals cacao en cashewnoten.



VERSPREIDINGSGEBIED MOORMAKI'S

VOEDING

De moormaki's foerageren zowel gedurende de nacht als overdag maar vooral in de vroege morgen en late namiddag.

Het zoeken naar voedsel gebeurt vooral in het midden en bovenste gedeelte van het regenwoud.

Vruchten vormen het grootste deel van het dieet. Ze eten ook jonge bladeren, bloemen, paddenstoelen en af en toe ongewervelde dieren zoals duizendpoten.

Deze maki's spelen een belangrijke rol in het **verspreiden van zaden** in het regenwoud doordat zij veel fruit eten. In het droger seizoen is ook nectar één van hun voedselbronnen.

BEDREIGD

De dieren worden bedreigd door habitatverlies, jacht (omwille van het vlees en de vacht) en illegale handel in huisdieren.

EEP

Het EEP is in handen van Dudley Zoo, Engeland. Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.

VOORTPLANTING

Geslachtsrijp rond de leeftijd van **twee jaar**.

De **paartijd** is seizoensgebonden en afhankelijk van de hoeveelheid daglicht. Dus voornamelijk **eind april en mei**.

Mannetjes vechten onderling voor de vrouwtjes die vruchtbaar zijn.

Na een **draagtijd** van ongeveer **125 - 127 dagen** wordt er **één jong** geboren, **soms een tweeling**. Bij de geboorte klemt het jong zich vast aan de buik van de moeder. Na ongeveer 1 maand klimt het op de rug van de moeder.

Het **spenen** gebeurt op **6 - 7 maanden**.

IUCN-status
KWETSBAAR

