

SANGLIER DES VISAYAS



NOM NÉERLANDAIS
Visayawrattenzwijn

NOM FRANÇAIS
Sanglier des Visayas

NOM ANGLAIS
Visayan warty pig

NOM SCIENTIFIQUE
Sus cebifrons

LES SANGLIERS DES VISAYAS ...

- ont - chez les mâles adultes - une belle **houppette** sur la tête. Pendant la saison de reproduction, les poils poussent même encore un peu.
- ont, comme les autres cochons sauvages, des queues droites, pas en tire-bouchon.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe: mammifères
- Ordre: artiodactyles
- Famille: porcins
- Longueur tête-tronc: ± 100 cm
- Hauteur au garrot: ♂ jusqu'à 63 cm ♀ 30 - 45 cm
- Poids: ♂ 35 - 40 kg ♀ 20 - 35 kg
- Longueur de la queue: ± 23 cm
- Âge maximum: jusqu'à 18 ans dans les parcs animaliers



AIRE DE RÉPARTITION

Les sangliers des Visayas se rencontrent aux Philippines.

BIOTOPE

Ils vivent dans des pâturages et des forêts.





RÉGIME ALIMENTAIRE

Les sangliers des Visayas se nourrissent d'herbes, de fruits et de feuilles de chênes verts, palmiers, bananiers et de vers de terre.

REPRODUCTION

2 à 4 marcassins naissent après une gestation de 118 jours.

MENACÉ

La menace est provoquée par la perte de leur habitat (en raison de la déforestation et de l'agriculture) et la chasse aux animaux pour la viande.

EEP

L'EEP est géré par le zoo de Wrocław (Pologne). L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces menacées, appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne le programme d'élevage.



Statut IUCN
**EN DANGER
CRITIQUE**